

Aus dem zahnärztlichen Institut der Universität München

Hygienische Untersuchungen über die Becher zum Mundspülen in der zahnärztlichen Praxis.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Würde eines Doctoris medicinae dentariae.

Einer hohen medizinischen Fakultät der

Ludwig-Maximilians-Universität München

vorgelegt von

Ekkehard Klemm

Zahnarzt



Buchdruckerei Wilhelm Veit, Überlingen a. B.

1932

Gedruckt mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät
der Ludwig - Maximilians - Universität zu München.

Referent:

Prof. Dr. Maximilian K n o

Meinen Eltern
und meinem Bruder in Dankbarkeit
gewidmet.

Lebenslauf.

Am 15. Juni 1907 bin ich als Sohn des Bildhauers Albert Klemm und seiner Ehefrau Frieda, geb. Schlenker zu Überlingen am Bodensee geboren.

Meine Schulbildung erhielt ich in der Volksschule, in der Realschule zu Überlingen am Bodensee, dann in den Oberrealschulen zu Friedrichshafen und Singen am Hohentwiel, wobei ich an letzterer am 15. März 1928 meine Reifeprüfung ablegte.

Im Anschluß studierte ich an der Albert Ludwigs Universität in Freiburg i. Br. Zahnheilkunde und bestand nach dem 3. Semester an derselben Hochschule meine zahnärztliche Vorprüfung. Meine klinischen Semester studierte ich an der Universität in München und bestand im Herbst 1931 nach Ablauf meines 7. Semesters das zahnärztliche Staatsexamen.

Hygienische Untersuchungen über die Becher zum Mundspülen in der zahnärztlichen Praxis.

Müller* hatte in seiner Arbeit eine größere Anzahl von Mundspülgläsern des Münchener zahnärztl. Institutes, die durchwegs frisch für den Patienten hergerichtet waren, daraufhin geprüft, ob sie mit pathogenen Keimen behaftet sind. Die Untersuchungen wurden so ausgeführt, daß mit sterilen Tupfern die Gläser am Grunde, am Rande und außen am Rande abgerieben wurden. Die alsbald angelegten Aussaaten auf Traubenzucker- und Kochblutagar wurden 24 — 48 Stunden bebrütet, die aufgegangenen Kolonien gezählt und nach Möglichkeit die aufgegangenen Keimarten zu identifizieren versucht.

Zur Zählung der Keime standen damals nur Petrischalen zur Verfügung, so daß die kleine Oberfläche oft so dicht bewachsen war, daß nur schätzungsweise Angaben gemacht werden konnten. Zusammenhängende Rassen verhinderten vielfach auch jegliche Schätzung. Ferner konnten von der chirurgischen Abteilung damals aus äußeren Gründen nur 8 Becher, die im Spülraum für Zahnextrahierte zur Verfügung standen, untersucht werden. Die in diesem Raum aufgestellten Becher schienen aber besonders wichtig, weil Patienten nach Zahnextraktionen Krankheitserreger

*) Hygienische Untersuchungen an zahnärztlichen Mundspülgläsern.
Inaug. Diss. 1931.

besonders zahlreich einerseits im Munde haben können, andererseits sich natürlich auch leicht mit den vom Becher flammenden Keimen infizieren können.

Die Untersuchungen erstreckten sich auf Becher, die durch Schwenken in Oxycyanatlösung, abspülen in laufendem heißem Wasser und abtrocknen gereinigt waren. Diese Becher bleiben dann während des Vormittags in laufendem Betrieb. Um die Möglichkeiten der Übertragung von Krankheitserregern durch diese Becher zu erfassen, haben wir sie untersucht, nachdem 3 — 6 Patienten sie benützt hatten. Am Schluß des Behandlungsvormittags wird der Becher mindestens von 6, höchstens von 12 Patienten benützt, ohne daß er neu in der eingangs angegebenen Weise gereinigt worden war. Zwischendurch erfolgt eine Spülung nur in Wasser, die die Patienten selbst vornehmen müssen.

Die Untersuchungsmethode haben wir ebenfalls abgeändert. Wir wollten den Verhältnissen in der Praxis möglichst nahekommen und haben deshalb nur den Becherrand auf einer Kochblutagarplatte, Ph 7,2 und 7,8 vorsichtig, wie es schon die Konsistenz dieses Nährbodens erfordert, auf der Oberfläche abgestreift. Die Berührung beim Spülen mit den Lippen ist eher eine intensivere, so daß unsere Ergebnisse in dieser Richtung nicht auf übertriebene Versuchsbedingungen zurückgeführt werden können. Die Oberfläche der Nährböden betrug 153,9 qcm, war also ca. $2\frac{1}{2}$ mal größer als die der Petri Schale. Die aufgegangeenen Kolonien haben wir größtenteils untersucht. Nur dann, wenn die sog. Apathogenität der Arten ohne weiteres feststand, wurde auf genauere Untersuchung verzichtet.

	Zahl der Keime	reingezüchtet wurden
Becher I	2900	Staph. hämolyt. und nicht hämolyt., Strept. hämolyt., Influenza
Becher II	876	Staph. hämolyt. Strept. hämolyt.
Becher III	216	Strept. hämolyt. Staph. hämolyt.
Becher IV	720	Microc. catarrhalis
Becher V	3200	Interococcen Influenza
Becher VI	71	Strept. hämolyt.
Becher VII	258	Strept. hämolyt. Staph. hämolyt. Influenza
Becher VIII	687	Micr. catarrhalis Staph. nicht hämolyt.
Becher IX	1850	Strept. hämolyt.
Becher X	744	Strept., nicht hämolyt. Staph. pyog. aur. hämolyt. Staph. hämolyt. Micr. catarrhalis
Becher XI	1250	Influenza Strept. nicht hämolyt.
Becher XII	610	Staph. pyog. aur., nicht hämolytisch Strept. nicht hämolytisch

	Zahl der Keime	reingezüchtet wurden
Becher XIII	1520	Strept. nicht hämolyt., Staph. pyog. aur. hämolyt.
Becher XIV	2600	Staph. pyog. aur. nicht hämolyt., weissl. Staph. Enterococcen, Strept. hämolyt.
Becher XV	2800	Staph. pyog. aur. hämolyt., Strept. hämolyt. Enterococcen, Micr. catarrhalis
Becher XVI	459	Strept. nicht hämolyt. weissl. Staph.
Becher XVII	1950	Staph. pyog. aur., nicht hämolytisch, Enterococcen Strept. hämolyt.
Becher XVIII	1650	Strept. hämolyt., Staph. pyog. aur. nicht hämolyt., Micr. catarrhalis
Becher XIX	2100	Strept. nicht hämolyt., Staph. pyog. aur., nicht hämolyt., weissl. Staph. nicht hämolytisch
Becher XX		Strept., nicht hämolytisch, weissl. Staph., nicht hämolyt., Micr. catarrhalis.

Somit finden sich am Becherrand 71 bis 3200 Keime. An fast allen der 20 untersuchten Becher finden sich pathogene Keime.

Auffallend war, daß zu einer Zeit, wo an sich Katarrhe, Anginen häufig waren, 4 × Influenzabazillen gezüchtet werden konnten.

Außerdem überrascht der häufige Befund von *Micrococcus catarrhalis*. Ob die Staphylococcen und Streptococcen auch dann, wenn Haemolyse nachgewiesen ist, immer pathogen sind und umgekehrt, ob anhämolytische Staphylococcen und Streptococcen apathogen sind, läßt sich nicht entscheiden. Die Untersuchungen haben aber ergeben, daß fast regelmäßig der Rand der Becher mit pathogenen Keimen verunreinigt ist. Dabei ist es so, daß z. B. Influenzabazillen, *Micrococcus catarrhalis*, *Staph. pyog. aur.*, vor allem aber Streptococcen vielfach das Bild beherrschen. Müllner hatte an den gereinigten Bechern derselben Abteilung pathogene Keime überhaupt nicht nachweisen können. Es fanden sich fast stets Luftkeime, nur einmal Acidobakterien und pneumococcenähnliche Streptococcen, die nicht näher untersucht werden konnten, da weitere Überimpfungen fehlgeschlugen. Müllner hatte schon darauf hingewiesen, daß versucht wird, bei großem Andrang die Spülbecher auch während der Behandlungszeit durchzureinigen. Er hat aber auch an 3 so präparierten Bechern nicht solche Befunde erheben können, wie sie in vorliegender Tabelle verzeichnet sind. Da durch die wirtschaftliche Not immer mehr Menschen gezwungen werden, in die Klinik zur Behandlung zu gehen, ist der Andrang im allgemeinen auf das 3 und mehrfache gegen früher gestiegen. Der vorliegende Befund berechtigt zu der Forderung, daß die durch die Zeiten der Not hervorgerufenen weiteren Verschlechterungen behoben werden müssen.

Wir haben in dieser Richtung zahlreiche Versuche gemacht und Müllner hat schon auf die sog. Taumalitbecher hingewiesen. Sicher ist, daß in derartigen großen Betrieben Reinigung und Desinfektion immer etwas unzuverlässiges bleiben werden. Es sei denn, man nimmt kostspielige Spülapparate in Gebrauch, für die wieder Platz, Personal usw. nötig wird. Derartige Dinge

kommen heutzutage nicht in Frage. Wir haben deshalb versucht, Pappbecher, wie sie vielfach an Bahnhöfen, Milchkiosken ufw. verwendet werden, in den Klinikbetrieb einzuführen.

Die uns von der Firma Josef Lehnert A.G. zur Verfügung gestellten Ipa-Becher sind nach Angaben der Firma aus Zellulose hergestellt. Die Imprägnierung erfolgt „mit einem völlig geschmack- und geruchfreien Paraffin“. Bei der Verarbeitung kommen Temperaturen von 95 — 110° in Frage, so daß eine Abtötung von Nichtsporenbildnern gewährleistet sein müßte. Nach der Fertigstellung werden die Becher sofort staubfrei verpackt, nachträgliche Berührung durch Hände ist ausgeschlossen. Die Becher sollen in diesem Zustand in den Automaten gebracht werden, wobei ebenfalls für staubfreie Aufbewahrung gesorgt sein soll. Wir haben zunächst von der Firma gelieferte Becher auf ihren Keimgehalt untersucht, indem wir die darüberliegende Wachsschicht mit dem Messer etwas abkratzten und das Material mit sterilen Pinsetten so aufrißen, daß hier ein Paraffinüberzug überhaupt nicht mehr vorhanden war.

Lfd. Nr. der Becher	Bechermitte			Becherrand		
	1 Proz. Traubenz.- brühe	3 Proz. Traubenz.- brühe	Leber- brühe	1 Proz. Traubenz.- Agar	Kochbl. Agar	Kochbl. Agar
1	Erdbaz.	kein Wachst.	kein Wachst.	kein Wachst.	kein Wachst.	kein Wachst.
2	"	"	"	"	"	"
3	kein Wachst.	"	"	"	"	Erdbaz.
4	Becherfalz					
	Erdbaz.	kein Wachst.	kein Wachst.	kein Wachst.	kein Wachst.	kein Wachst.

Es zeigte sich somit, daß nur sporenbildende Erdbazillen und die nur in geringer Zahl in dem Bechermaterial vorhanden sind.

Wäre eine stärkere Verunreinigung mit diesen Erdbazillen vorhanden, so hätten die anderen Nährflüssigkeiten Wachstum zeigen müssen.

Um sicher zu sein, daß nicht am Becherrand Keime haften, die bei Benützung der Becher in den Mund kommen könnten, wurde der Becherrand in gleicher Weise wie vorhin die Versuchsbecher auf der Oberfläche der in der Tabelle angegebenen Nährböden abgestreift. Die Nährböden blieben steril.

Um zu untersuchen, ob in den Bechern nicht entwicklungshemmende Stoffe diesen Befund vortäuschen, wurden Becherteile steril ausgeschnitten und in Nährböden eingebettet. Nach 48 stündiger Bebrütung bei 37° wurden Platten beimpft, mit *B. coli*, *Staph. pyog. aur.* und *Mes. ruber*.

Hemmungsversuch.

Coli.

Lfd. Nummer		Agar ohne	1%iger Traubenz.-Agar
Becher I	Rand	Erdbaz.	Erdbaz.
	Mitte	Schimmelpilze	k. H.
	Boden	/	k. H.
Becher II	Rand	k. H.	k. H.
	Mitte	k. H.	k. H.
	Boden	k. H.	k. H.
Becher III	Rand	k. H.	k. H.
	Mitte	Erdbaz.	k. H.
	Boden	Erdbaz.	k. H.

Zur genaueren Feststellung wurde letzterer Versuch noch erweitert durch Verwendung von *Staphylococcus pyog. aur.* und *Mes. ruber*.

Lfd. Nr.		A g a r ohne			1 % iger Traubenz.-Agar		
		Mes. rub.	Staph. pyog.aur.	Coli	Mes. rub.	Staph. pyog.aur.	Coli
Becher I	Rand	k. H.	k. H. Erdbaz.	k. H.	k. H.	k. H.	k. H.
	Mitte	k. H.	k. H.	k. H.	k. H.	k. H.	k. H.
	Boden	k. H.	k. H.	k. H.	k. H.	k. H.	k. H.
Becher II	Rand	k. H.	k. H.	k. H.	k. H.	k. H. Erdbaz.	k. H.
	Mitte	k. H.	k. H.	k. H.	k. H.	k. H.	k. H.
	Boden	k. H.	k. H.	k. H.	k. H.	k. H.	k. H.
Becher III	Rand	k. H.	k. H.	k. H.	k. H.	k. H.	k. H. Erdbaz.
	Mitte	k. H.	k. H.	k. H.	k. H.	k. H. Erdbaz.	k. H. Erdbaz.
	Boden	k. H.	k. H.	k. H.	k. H.	k. H. Erdbaz.	k. H. Erdbaz.

Eine Hemmung war nicht festzustellen. Da bei dieser Temperatur eine Diffusion entwicklungshemmender Stoffe in die halbfesten Nährmittel hätte erfolgen müssen, ist anzunehmen, daß größere Mengen entwicklungshemmender Stoffe in den Bechern nicht vorhanden sind, so daß der vorhin erhobene bakteriologische Befund die tatsächlichen Verhältnisse wiedergibt, d. h. außer sporenbildenden Erdbazillen sind Keime in den Bechern nicht vorhanden. Dabei sei hervorgehoben, daß am Becherrand überhaupt keine Keime nachweisbar waren. (Siehe Tabelle!)

Auf manchen Platten konnte allerdings die Hemmung nicht mehr festgestellt werden, da die im Papier enthaltenen Erdbazillen durch den Agar durchwucherten und so jede weitere Untersuchung verhinderten.

Zur weiteren Kontrolle wurden Papierbecher, die den in der Klinik aufgehängten Automaten entnommen wurden, untersucht.

Diese Becher werden in Papierhüllen zu 10 und mehr Packungen von der Fabrik geschickt, von dem Klinikpersonal in den Automaten gefüllt und zunächst probeweise vom Patienten für 5 Pfg. teils durch die Schwestern, teils selbst dem Automaten entnommen. Es bestehen 2 verschiedene Typen von Automaten. Der eine sieht aus wie eine lange Blechhülle, wobei die ineinandergeschachtelten Becher von oben eingefüllt werden. Der untere Teil des ersten Bechers ragt unten aus der Hülle heraus und kann durch leichten Zug dem Automaten entnommen werden, dabei wird der untere Teil des nächsten Bechers sichtbar. Die Becher hängen also mit dem oberen Rand im Automaten, der sie durch leichten Federdruck festhält. Der zweite Automat stellt einen Kasten dar, der jedem normalen Automaten gleicht. Die Becher sind hier ganz im Automaten eingeschlossen; eingefüllt werden sie wie bei Typ 1 vom Klinikpersonal, und zwar kann man mittels eines Schlüssels den Automaten an der Seite öffnen. Dieser Automat wird an einem von jedem die Klinik verlassenden Patienten leicht zu sehenden Orte aufgehängt. Durch Einwurf von 5 Pfg. und drehen eines Hebels nach links fällt ein Becher in den unten am Automaten eingestanzten Behälter.

Aus dem ersten Typ, also der Blechhülle, entnahmen wir 10 Becher und strichen sie mit ihrem oberen Rand, also dem Teil, der im Automaten steckt, auf Agar ab. Es ergab sich folgender bakteriologischer Befund.

	Zahl der Keime	reingezüchtet wurden
Becher I	14	weißl. Staph., nicht hämolylt., Staph. pyog. aur., Sarzinen
Becher II	115	weißl. Staph., nicht hämolyltisch, Strept., Sarzinen
Becher III	4	Sarzinen
Becher IV	10	weißl. Staph., nicht hämolylt., Sarzinen
Becher V		steril
Becher VI	8	Staph. pyog. aur., nicht hämolylt., weißl. Staph., Sarzinen
Becher VII	5	Sarzinen grameg. Stäbchen
Becher VIII	4	weißl. Staph., nicht hämolylt., Sarzinen
Becher IX	14	weißl. Staph., nicht hämolylt., Sarzinen
Becher X	6	Sarzinen

Wir sehen also, daß die Automatenbecher bakteriologisch nicht die Beschaffenheit aufwiesen wie die direkt aus der Fabrik geschickten. Dies kann also nur am Einfüllen oder am Automaten selbst liegen. Daß es z. T. am Einfüllen liegt, konnten wir uns mit eigenen Augen überzeugen, als der Klinikdiener den Automaten öffnete, um uns die Technik des Einfüllens zu zeigen. Er strich dabei mit seinem Finger, mit welchem er kurz zuvor Speihbecher ufw. gereinigt hatte, an den Becherrändern entlang!

Was die Automaten selbst anbelangt, so muß festgestellt werden, daß der Kastenautomat dem Röhrenautomaten weit überlegen ist, daß aber trotzdem der unten angebrachte Behälter durch einen Schieber verschlossen werden müßte, da hier jeder Patient, wenn er hustet, Mundbakterien in den Behälter bringt, in den dann der Becherrand zu liegen kommt. Außerdem müßte der Hebel nach rechts und nicht nach links gedreht werden können, da der Automat wiederholt deshalb versagte. Nach diesen Abänderungen und bei einwandfreiem Einfüllen von Seiten des Personals wäre dieser Automat zu empfehlen.

Der Typ 1, also der Röhrenautomat, ist in seiner jetzigen Konstruktion vollkommen unzureichend, schon weil ein Teil des Bechers aus dem Automaten herausragt und von der Schwester bedient werden muß, da beliebig viele Becher durch Zug nach unten entnommen werden können. Hier läßt sich schwer eine Abänderung vornehmen.

Die einfachste und praktischste Lösung überhaupt wäre die, wenn jeder Becher bei der Herstellung in eine sterile Serviette eingehüllt würde, die am Becherrand eingestülpt ist, so daß trotzdem die Becher ineinandergeschachtelt werden können. Dies müßte sich maschinell sehr leicht und ohne große Unkosten ausführen lassen. Auf diese Weise würden die Becher einwandfrei entnommen werden können.

Gegen die Benützung der Becher ist somit bei Beachtung der obenniedergelegten Gesichtspunkte vom hygienischen Standpunkt aus nichts einzuwenden. Sie sind für Mundspülzwecke in jeder Beziehung einwandfrei.

Ein wichtiger Gesichtspunkt für die Verwendung in der Praxis ist jedoch ihre Beurteilung im Publikum.

Wir haben uns zu diesem Zwecke mit Praktikern in Verbindung gesetzt und auch selbst Patienten derartige Becher gegeben und ihre Angaben zusammengestellt. Darüber soll im folgenden berichtet werden:

Es galt zunächst, die Becher in der Praxis auf Festigkeit, Geschmack und Widerstandsfähigkeit gegen Wärme zu prüfen. Ich nahm zu diesem Zwecke aus dem in der Klinik aufgestellten Automaten eine Anzahl Becher und verteilte sie an Patienten und beobachtete, wie sie damit zurechtkamen. Bis auf die Widerstandsfähigkeit gegen Wärme entsprachen die Becher jeder Anforderung. Ich machte die Beobachtung, daß der Becher, wenn er mehrmals nacheinander mit ziemlich warmem Wasser ($35 - 40^{\circ}$) gefüllt wird, allmählich seine steife Form verliert und einknickt. Besonders konnte ich dies bemerken bei Patienten, die durch eine vorhergegangene Operation ziemlich geschwächt waren und die Becher mit zitternden und unsicheren Händen anfaßten.

Dann machte ich Untersuchungen bei Patienten, die nur gewöhnliche Eingriffe, Zahnextraktionen usw. hinter sich hatten. Dabei zeigte sich, daß selbst bei mehrmaligem Nachspülen mit warmem Wasser der Becher noch immer genügende Stabilität aufwies. Allgemein konnte ich feststellen, daß fast alle Patienten sich leicht und sicher der Becher bedienen und auf mein Befragen, ob irgendwie der Geschmack des Wassers verändert würde oder ob der Becher selbst irgendeinen störenden Geschmack an sich habe, verneinten alle Patienten.

Ein Teil der Patienten bemängelte, daß die Becher eine ungenügende Widerstandskraft gegen Eindrücken aufweisen, was aber von der Firma durch Zugabe irgendwelcher versteifender Materialien bei neuen Bechern behoben werden könnte.

Nun galt es weiter, die Verwendungsmöglichkeit der Becher bei Kindern auszuprobieren, welche ja bekanntlich am ängstlichsten bei der Behandlung sind. Zu diesem Zwecke machte ich Versuche in der städt. Schulzahnklinik. Ich nahm eine Anzahl Becher

von verschiedener Größe und beobachtete die Kinder beim Spülen. Selbst die ängstlichen kamen mit den Bechern zurecht. Nur bemerkte ich, daß die kleineren Becher ganz besonders für Kinder geeignet sind, z. T. auch durch ihre etwas steifere Form, wie auch durch ihre Größe. Die Versuche wurden bei Kindern von 6 — 9 Jahren gemacht, die, wie überhaupt alle Schulkinder, diese Art Becher von ihren täglichen Frühstückspausen in der Schule kennen, wo sie Milch aus ganz ähnlichen Papierbechern zu trinken bekommen. Man sieht daraus, wie sich relativ einfache hygienische Einrichtungen, die für die Ausschaltung der Übertragung von Infektionen eine große Bedeutung haben, durch Erziehung und Beispiel leicht einführen lassen.

Vom wirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet ist zu bemerken, daß die Einführung der Becher, z. B. in der konservierenden Abteilung ohne weiteres durchzuführen ist, da durch die Ungeschicklichkeit der Studierenden, Patienten und des Pflegepersonals täglich etwa 10 Becher zerbrochen werden, was bei einem Einzelkostenpreis von 30 Pfg. allein 3 RM. ausmacht.

Die Fabrik liefert bis heute die Papierbecher bei Kleinabnahme zum Preis von 5 Pfg. pro Becher, bei Großabnahme von 4 bzw. 3 Pfg. Wenn wir uns noch dazu für die kleineren Becher entschließen, die, wie die Versuche zeigten, ganz besonders bei Kindern und alten Leuten aus den schon angeführten Gründen sehr geeignet sind, so dürfte der Becher kaum teurer als 3 Pfg. sein. Wir bekämen also für die 10 zerbrochenen Gläser pro Tag schon 100 Papierbecher. Rechnen wir nun noch die Unkosten des Materials und der Arbeit, die täglich für Desinfektion der Gläser ausgegeben werden, so lassen sich leicht 300 Papierbecher pro Tag dafür anschaffen, ohne daß die Abteilung Mehrkosten dadurch hat. Mit dieser Anzahl Spülbecher dürfte die konservierende Abteilung leicht durchkommen, da höchstens 250 Patienten pro Tag behandelt werden. Auf diese Weise hätte jeder Patient seinen in jeder Beziehung einwandfreien Spülbecher, der am Schluß der Behandlung weggeworfen werden muß.

Aus solchen der Praxis entnommenen Berechnungen ergibt sich, daß der Einwand, derartige hygienische Einrichtungen würden zu teuer sein, hinfällig ist. Wir sehen im Gegenteil, daß hier einerseits die öffentliche Hygiene gefördert wird und andererseits keine Mehrausgaben entstehen.

In der chirurgischen Abteilung entstehen der Klinik durch die Emaillebecher natürlich geringere Kosten. Hier darf aber nicht der wirtschaftlichere Teil entscheiden, sondern ganz allein der hygienische, und daß vom hygienischen Standpunkt aus eine Änderung eintreten muß, ergibt sich aus den vorausgegangenen Untersuchungen. Ganz abgesehen davon spült jeder Patient sicher viel lieber aus einem frisch aus dem Automaten genommenen Papierbecher als aus einem herumstehenden rißigen Emaillebecher, mag er noch so gut desinfiziert sein. Es ist sicher, daß manche Patienten schon aus Ekel kaum spülen.

Die heute in der chirurgischen Abteilung aufgestellten Emaillebecher genügen schon ihrer Zahl wegen bei weitem nicht den an sie gestellten Forderungen, andererseits lassen die beschränkten Verhältnisse keine viel größere Zahl zu.

Wir haben heute allein in der chirurgischen Abteilung, wie schon früher erwähnt, eine Patientenzahl von 40 — 120 pro Tag. Es müßten also mindestens 60 Emaillebecher angeschafft werden, die im Verlauf jedes Vormittags nochmals desinfiziert werden müßten, nachmittags ebenfalls, da ab 3 Uhr wieder Patienten kommen und für den folgenden Morgen wieder.

Die techn. Abteilung wäre evtl. die einzige Abteilung, in welcher die Anschaffung der Papierbecher keine Notwendigkeit wäre, da der Patientenwechsel gering ist und eine genügende Zahl Spülbecher laufend desinfiziert werden kann. Hier spielte auch der Spülbecher nicht die Rolle, wie in der konservierenden Abteilung, da meist Patienten mit saniertem Gebiß oder mit zahnlosen Kiefern diese Abteilung aufsuchen.

Doch ist auch in dieser Abteilung in der letzten Zeit ein stark vermehrter Patientenandrang festzustellen, der eine mehrmalige Desinfektion der vorhandenen Spülgläser am Tage notwendig macht. Ob die zur Desinfektion zur Verfügung stehende Zeit

ausreicht, muß sehr bezweifelt werden. Auf jeden Fall kommt die Anschaffung der Papierbecher auch hier nicht teurer.

Die Erfahrung in der Schulzahnklinik hat gezeigt, daß gerade hier die Becher um so mehr zu empfehlen sind, da einerseits die Mundhöhle der Kinder sehr oft leicht übertragbare, pathogene Keime beherbergt (Diphtherie, epidem. Kinderlähmg., Meningitis, Scharlach), andererseits eine für viele Infektionskrankheiten erhebliche Disposition besteht. Ein nachgewiesener Fall von übertragener Infektionskrankheit, durch ein ungenügend desinfiziertes Spülglas entstanden, könnte der verantwortlichen Stelle teuer zu stehen kommen.

Wir wissen, daß heute das Publikum über derartige Fragen vielfach so gut aufgeklärt ist, daß die Unterlassung einfacher hygienischer Forderungen in öffentlichen Anstalten, bei eintretender Schädigung nicht mehr ohne weiteres hingenommen wird.

Wollte man anführen, daß in Wirtschaften usw. das Geschirr und die Trinkgläser ebenfalls nicht nach jedem Gebrauch desinfiziert, ja oft nicht mal genügend gespült werden, wie Hool in seiner Arbeit nachwies und Stiglitz durch ihre Untersuchungen für München zeigte, ohne daß Krankheiten in größerem Maße übertragen werden, so ist dem entgegenzustellen, daß einerseits in einer Klinik für Zahn- und Mundkranke die Keimzahl eine weit größere und pathogenere ist, andererseits die Disposition der betreffenden Menschen für Infektion eine größere ist. Wir sind überdies der Ansicht, daß wir uns über den Umfang der auf diese Art und Weise eintretenden Infektion täuschen. Das Ausspucken ist in erster Linie wegen Erregung von Ekel fast überall verboten; auf die Zustände, die man nicht sieht, wie die unhygienische Beschaffenheit der Geschirre, Mundspülgläser, achtet man weniger, obwohl sie viel gefährlicher sind.

In der Privatpraxis wird die Einführung der Papierbecher leider von Seiten der Patienten selbst Schwierigkeiten machen. Ich habe mich mit mehreren Kollegen der Privatpraxis in Verbindung gesetzt und ausnahmslos gehört, daß die Patienten nur ein geschliffenes Glas zum Spülen nehmen wollen und keinen

billigen „Papierbecher“. Die unhygienische Seite wird für selbstverständlich einwandfrei gehalten.

Zuletzt, aber nicht am wenigsten, müssen wir noch einen Punkt in Betracht ziehen. Einwandfreie Becher und Automaten allein genügen nicht, um die Papierbecher in die Praxis einzuführen. Man muß sie sozusagen dem Patienten mundgerecht machen, was sehr leicht durch eine auffallende Reklame in den Warteräumen geschehen kann. Sehr viele Patienten sind so wenig hygienisch erzogen, daß z. B. von den 7 im Spülraum der klinischen Abteilung aufgestellten Emaillebechern sehr oft nur 4 von ca. 60 Patienten benutzt werden, weil sie zu gleichgültig sind, die anderen 3 oben auf dem Regal aufgestellten Becher zu nehmen, sondern den nächstbesten, zum Teil mit Blut und Eiter beschmierten kurz unter das fließende Wasser halten und dann damit spülen. Andererseits sind auch diese Leute, wenn ihnen bildhaft die Gefahren ihres Handelns vor Augen geführt werden, gerne bereit, ein kleines Geldopfer zu bringen, um sich vor irgend welchen Ansteckungen zu schützen, denn im allgemeinen ist das Klinikpatientenmaterial sehr mißtrauisch in diesem Punkt, weil durch die große Masse und durch die getrennten Raumverhältnisse mancher die Krankheit des anderen sieht und durch üblen Geruch oder andere Unannehmlichkeiten angeekelt und abgedreht wird.

Zum Schluß möchte ich nicht verjäumen, an dieser Stelle meinem verehrten Referenten Herrn Prof. Dr. Maximilian Knorr für die gütig gewährte Arbeitsmöglichkeit, wie auch für die lebenswürdigen Ratschläge und Herrn Prof. Dr. Paul Kranz für die freundliche Anregung zu dieser Arbeit meinen wärmsten Dank auszusprechen.
